

# 치료가 XDEMZY®로 손쉬워 집니다



점안액은 모든 방울이 중요합니다!  
XDEMZY를 사용한 치료를 숙지하십시오.

6주 동안 1일 2회(약 12시간 간격)  
각 눈에 한 방울씩 넣습니다.  
알람을 설정하고 용량을 추적하십시오!

시작 날짜: \_\_\_\_\_

	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
제1주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후
제2주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후
제3주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후
제4주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후
제5주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후
제6주	오전	오전	오전	오전	오전	오전	오전
	오후	오후	오후	오후	오후	오후	오후

**중요: 전체 6주 치료 과정 동안 XDEMZY를  
투여합니다.**

- ➔ 다른 국소 눈 약물을 사용하고 있는 경우,  
각 약물 사이에 최소 5분의 간격을 두도록 합니다
- ➔ 콘택트 렌즈를 빼고 다시 삽입하기 전에 XDEMZY를  
도포한 후 15분간 기다립니다
- ➔ 눈꺼풀 위생 습관 지속에 관해서는 **담당 의사와  
상의하십시오**

의심되는 이상반응을 보고하려면, 1-888-421-4002로  
Tarsus Pharmaceuticals에 연락하거나 1-800-FDA-1088  
또는 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)로 FDA에 연락하십시오.

**이 설명서의 중요 안전성 정보와 주머니의 전체 처방 정보를  
참조하십시오.**

# XDEMZY® 사용 및 지원

xdemzy®  
(lotilaner ophthalmic  
solution) 0.25%



XDEMZY가 처방되면 담당 의사가 다음 약국 중  
하나로 귀하의 처방전을 보낼 것입니다.

- AllianceRx Walgreens: 1-800-424-9002
- Carepoint Pharmacy: 1-855-237-9112
- BlinkRx: 1-833-919-4942
- CVS Specialty: 1-800-237-2767

① 의사가 귀하의 처방전을 발송하면, 약국으로부터 직접  
문자나 전화 통화가 있을 것으로 예상되며 처방약 보충  
정보를 준비해 드립니다

**치료가 지연되지 않도록 귀하가 답변하는 것은 중요합니다**

- 48시간 이내에 전화나 문자 메시지를 받지 못한 경우,  
선택한 약국에 연락하십시오

② 약국에서는 담당 의사를 통해 필요한 모든 서류를 작성하고  
해당하는 모든 할인을 적용할 것입니다

③ 본인부담금이 필요한 경우, 약국에서 연락하여 지금을  
요청할 것입니다. 처방약은 지급을 받을 때까지  
배송되지 않을 것입니다

④ 약국이 귀하와 협력하여 귀하의 가정이나 현지 약국으로의  
배송을 준비할 것입니다

⑤ XDEMZY 투여를 시작합니다

**XDEMZY 사용 및 지원은 1-866-846-3092번으로  
Tarsus Connect에 문의하십시오.**

**참고문헌:** 1. XDEMZY, 처방 정보. Tarsus Pharmaceuticals Inc; 2023. 2. XDEMZY Pivotal Trial Data Presentation. Tarsus Pharmaceuticals Inc. 3. Trattler W, Karpecki P, Rapoport Y, et al. The prevalence of Demodex blepharitis in US eye care clinic patients as determined by collarettes: a pathognomonic sign. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:1153-1164. 4. Fromstein S, Harthan J, Patel J, et al. Demodex blepharitis: clinical perspectives. *Clin Optom (Auckl)*. 2018;10:57-63. 5. O'Dell L, Dierker DS, Devries DK, et al. Psychosocial impact of Demodex blepharitis. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:2979-2987. 6. Rhee MK, Yeu E, Barnett M, et al. Demodex blepharitis: a comprehensive review of the disease, current management, and emerging therapies. *Eye Contact Lens*. 2023;49(8):311-318. 7. Yeu E, Mun J, Vollmer P, et al. Treatment of Demodex blepharitis with lotilaner ophthalmic solution (0.25%): combined analysis of two pivotal randomized, vehicle-controlled, multicenter trials. Presented at: ARVO 2023; April 25-27, 2023; New Orleans, Louisiana. 8. Yeu E, Wirta DL, Karpecki P, Baba SN, Holdbrook M; Saturn 1 Study Group. Lotilaner ophthalmic solution, 0.25%, for the treatment of Demodex blepharitis: results of a prospective, randomized, vehicle-controlled, double-masked, pivotal trial (Saturn-1). *Cornea*. 2023;42(4):435-443. 9. Gaddie IB, Donnenfeld ED, Karpecki P, et al. Lotilaner ophthalmic solution 0.25% for Demodex blepharitis: randomized, vehicle-controlled, multicenter, phase 3 trial (Saturn-2). *Ophthalmology*. 2023;130(10):1015-1023.



©2024 Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Tarsus, Tarsus 로고, XDEMZY, XDEMZY 로고  
및 기타 특정 상표는 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.의 상표입니다.  
US--2400056 2/24

xdemzy®  
(lotilaner ophthalmic  
solution) 0.25%



이미지는 모낭충 진드기를  
캐릭터로 묘사한  
것입니다.

# 눈꺼풀에 진드기 무리가 있습니까?



**모낭충 안검염(DB: Demodex blepharitis)을  
유발하는 모낭충 진드기를 표적으로 하여  
죽이는 최초이자 유일하게 FDA 승인을  
받은 점안액 치료제인 XDEMZY로 진드기  
무리를 퇴치하십시오.<sup>1,2</sup>**

## 적응증 및 용도

XDEMZY(로틸라너 안과용 액제) 0.25%는 모낭충 안검염  
치료에 적용됩니다.

## 중요한 안전성 정보

**가장 흔한 부작용:** 임상시험에서 가장 흔한 부작용은 환자의  
10%에서 발생하는 따끔거림과 작열감이었습니다. 환자의  
2% 미만에서 발생한 다른 부작용은 콩다래끼/다래끼 및 점상  
각막염이었습니다.

**이 설명서의 중요 안전성 정보와 주머니의 전체 처방 정보를  
참조하십시오.**

# 모낭충 안검염을 다루는 것은 어려울 수 있습니다

DB로 인한 눈꺼풀 발적, 염증, 눈곱  
(잔고리)이 사라지지 않습니까?<sup>3,4</sup>

기억하십시오. 귀하는 혼자 아닙니다.

**2천 5백만명의 진드기 환자가  
현재 고통받고 있습니다**



미국에서 약 2천 5백만 명의 안과 진료 환자들이  
DB의 영향을 받는 것으로 추정됩니다.<sup>3,5</sup>

모낭충 안검염은 사람에게서 흔히 발견되는 진드기인  
모낭충 진드기의 감염으로 인한 눈꺼풀 질환입니다.<sup>3,6</sup>  
DB를 치료하지 않고 두면 다른 눈 관련 질병에 취약해질  
수 있습니다.<sup>4</sup>

치료 계획에 XDEMZY®를  
포함시키면 진드기 무리를 퇴치하는  
데 도움이 될 수 있습니다!



6주 동안 1일 2회(약 12시간 간격) 각 눈에 한 방울씩 넣습니다.

## 중요한 안전성 정보(계속)

**용기 취급:** 용액의 오염을 최소화하기 위해 투여 용기의 팁이  
눈, 주변 구조물, 손가락 또는 기타 표면에 닿지 않게 하십시오.  
오염된 용액을 사용하면 눈에 심각한 손상을 입어 시력이 상실될  
수 있습니다.

이 설명서의 중요 안전성 정보와 주머니의 전체 처방 정보를  
참조하십시오.

xdemzy®  
(lotilaner ophthalmic  
solution) 0.25%

## XDEMZY®로 진드기 무리 퇴치하기


모낭충안검염에 대한 최초이자 유일하게 FDA 승인을 받은  
점안액 치료제로, XDEMZY는 진드기를 죽이고, 눈꺼풀 발적을  
없애고, 눈곱(잔고리)을 줄일 수 있습니다.<sup>1,2</sup> 개인별 결과는 다를  
수 있습니다.

### 도움이 되는 것으로 입증됨

두 건의 통합 시험에서, 환자의 50%는 딱지(칼라렛)가 감소했고,  
환자의 60%는 모낭충 진드기가 완전히 퇴치되었습니다.<sup>7\*</sup>  
XDEMZY를 사용한 환자는 6주만에 눈꺼풀 발적이 사라지는  
것을 볼 수 있습니다.<sup>1,2</sup>

### 간단한 투여

단 6주 동안 1일 2회 약 12시간 간격으로  
각 눈에 한 방울씩 넣습니다.



### 편안함을 위해 설계됨

두 임상시험에서 환자의 약 90%는 XDEMZY 점안액이  
사용하기에 매우 편안하다고 보고했습니다.<sup>7+</sup>

\*모낭충 안검염용 XDEMZY는 833명의 환자를 대상으로 한 2건의 핵심 임상시험  
(415명이 XDEMZY를 투여받음)에서 평가하였습니다.<sup>1,8,9</sup>

**임상시험 1:** 6주 동안 각 눈에 1일 2회 투여했을 때, XDEMZY를 투여받지 않은 환자와  
비교해 XDEMZY는 제43일에 환자의 44%(N=209)에서 윗눈꺼풀의 잔고리를 2 이하로  
감소시켰으며, XDEMZY는 제43일에 환자의 68%(N=212)에서 진드기를 퇴치(진드기  
밀도는 진드기 0마리/속눈썹)하였습니다.

**임상시험 2:** 6주 동안 각 눈에 1일 2회 투여했을 때, XDEMZY를 투여받지 않은  
환자와 비교해 XDEMZY는 제43일에 환자의 55%(N=193)에서 윗눈꺼풀의 잔고리를  
2 이하로 감소시켰으며, XDEMZY는 제43일에 환자의 50%(N=203)에서 진드기를 퇴치  
(진드기 밀도는 진드기 0마리/속눈썹)하였습니다.


<sup>1</sup>모든 방문 평균.

## 중요한 안전성 정보(계속)


**의사 조언을 구해야 하는 경우:** 병발 안구 질환(예: 외상 또는 감염)  
이 발생하거나, 안구 수술을 받거나, 안구 반웅, 특히 결막염 및  
눈꺼풀 반응이 발생하는 경우, XDEMZY의 사용 지속에 관한 의사의  
조언을 즉시 구하십시오.

이 설명서의 중요 안전성 정보와 주머니의 전체 처방 정보를  
참조하십시오.

눈곱



XDEMZY 투여 전



XDEMZY 투여 후

이 이미지는 Tarsus Pharmaceuticals에 대한 임상시험에 참여한 실제 환자의  
이미지입니다. 결과는 다를 수 있습니다. DB 환자는 6주 동안 각 눈에 XDEMZY를  
1일 2회 사용했습니다.

## XDEMZY®와의 연합



진드기 무리를 끝내기 위해  
다함께 노력합시다.

DB를 앓고 있는 여정에서 최신 정보를  
얻고, 지원을 받으며, 능력을 얻으십시오.

추가 교육, 실제 환자 이야기 등을  
보려면 [XDEMZY.com](http://XDEMZY.com)을  
방문하십시오!

우리는  박멸 중!

## 중요한 안전성 정보(계속)

**콘택트 렌즈와 함께 사용:** XDEMZY에는 소프트 콘택트 렌즈가  
변색될 수 있는 소르빈산 칼륨이 함유되어 있습니다. 콘택트  
렌즈는 XDEMZY 점안 전에 빼야 하며 투여 후 15분 시점에 다시  
삽입할 수 있습니다.

이 설명서의 중요 안전성 정보와 주머니의 전체 처방 정보를  
참조하십시오.