

ĐIỀU TRỊ TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN VỚI XDEMVY®



Mỗi giọt đều có ý nghĩa!
Điều trị tốt nhất bằng XDEMVY.

Nhỏ một giọt vào mỗi mắt, hai lần mỗi ngày (cách nhau khoảng 12 giờ), trong 6 tuần. Đặt cảnh báo và theo dõi liều lượng của quý vị!

Ngày bắt đầu : _____

	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ Nhật
Tuần 1	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tuần 2	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tuần 3	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tuần 4	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tuần 5	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tuần 6	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

QUAN TRỌNG: Dùng XDEMVY cho toàn bộ quá trình điều trị kéo dài 6 tuần.

- ➔ Nếu quý vị đang sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt khác, hãy đảm bảo nhỏ mỗi loại cách nhau ít nhất 5 phút
- ➔ Tháo kính áp tròng và đợi 15 phút sau khi nhỏ XDEMVY rồi mới đeo lại
- ➔ Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiếp tục thói quen vệ sinh mí mắt của quý vị

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI NGHI NGỜ, hãy liên hệ với Tarsus Pharmaceuticals theo số 1-888-421-4002 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc www.fda.gov/medwatch.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng trong tài liệu này và Thông tin kê toa đầy đủ.

SỬ DỤNG VÀ NHẬN HỖ TRỢ VỀ XDEMVY®

xdemvy®
(lotilaner ophthalmic solution) 0.25%



Nếu quý vị được kê XDEMVY, bác sĩ sẽ gửi toa thuốc của quý vị đến một trong những nhà thuốc sau:

- AllianceRx Walgreens: 1-800-424-9002
- Carepoint Pharmacy: 1-855-237-9112
- BlinkRx: 1-833-919-4942
- CVS Specialty: 1-800-237-2767

- ➊ Sau khi bác sĩ gửi toa thuốc, quý vị sẽ nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại trực tiếp từ nhà thuốc, vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị
Điều quan trọng là quý vị phải trả lời để việc điều trị không bị trì hoãn
 - Nếu quý vị không nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn trong vòng 48 giờ, hãy liên hệ với nhà thuốc đã chọn
 - ➋ Nhà thuốc sẽ hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết với bác sĩ của quý vị và áp dụng mọi khoản tiết kiệm áp dụng có thể
 - ➌ Nếu cần đồng thanh toán, nhà thuốc sẽ liên hệ và yêu cầu quý vị thanh toán; toa thuốc sẽ không được giao cho đến khi nhận được thanh toán
 - ➍ Nhà thuốc sẽ làm việc với quý vị để sắp xếp việc giao hàng đến nhà hoặc nhà thuốc tại địa phương của quý vị
 - ➎ Bắt đầu dùng XDEMVY
- Để được hỗ trợ và sử dụng XDEMVY, vui lòng liên hệ với Tarsus Connect theo số 1-866-846-3092.**

Tài liệu tham khảo: 1. XDEMVY. Thông tin kê toa. Tarsus Pharmaceuticals Inc; 2023. 2. XDEMVY Pivotal Trial Data Presentation. Tarsus Pharmaceuticals Inc. 3. Trattler W, Karpecki P, Rapoport Y, và cộng sự. The prevalence of *Demodex* blepharitis in US eye care clinic patients as determined by collarettes: a pathognomonic sign. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:1153-1164. 4. Fromstein S, Harthan J, Patel J và cộng sự. *Demodex* blepharitis: clinical perspectives. *Clin Optom (Auckl)*. 2018;10:57-63. 5. O'Dell L, Dierker DS, Devries DK và cộng sự. Psychosocial impact of *Demodex* blepharitis. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:2979-2987. 6. Rhee MK, Yeu E, Barnett M và cộng sự. *Demodex* blepharitis: a comprehensive review of the disease, current management, and emerging therapies. *Eye Contact Lens*. 2023;49(8):311-318. 7. Yeu E, Mun J, Vollmer P và cộng sự. Treatment of *Demodex* blepharitis with lotilaner ophthalmic solution (0.25%): combined analysis of two pivotal randomized, vehicle-controlled, multicenter trials. Trình bày tại: ARVO 2023; 25-27 tháng 4 năm 2023; New Orleans, Louisiana. 8. Yeu E, Wirta DL, Karpecki P, Baba SN, Holdbrook M; Saturn I Study Group. Lotilaner ophthalmic solution, 0.25%, for the treatment of *Demodex* blepharitis: results of a prospective, randomized, vehicle-controlled, double-masked, pivotal trial (Saturn-1). *Cornea*. 2023;42(4):435-443. 9. Gaddie IB, Donnenfeld ED, Karpecki P và cộng sự. Lotilaner ophthalmic solution 0.25% for *Demodex* blepharitis: randomized, vehicle-controlled, multicenter, phase 3 trial (Saturn-2). *Ophthalmology*. 2023;130(10):1015-1023.



©2024 Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Tarsus, logo Tarsus, XDEMVY, logo XDEMVY và một số nhãn hiệu khác trong tài liệu này là nhãn hiệu của Tarsus Pharmaceuticals, Inc. US--2400055 2/24

xdemvy®
(lotilaner ophthalmic solution) 0.25%



Hình ảnh là minh họa nhân vật của Demodex.

MI MẮT CỦA QUÝ VỊ BỊ VIÊM DO BỌ VE?



ĐIỀU TRỊ VIÊM BỜ MI

bằng XDEMVY, thuốc nhỏ mắt **đầu tiên và duy nhất** được FDA phê duyệt, nhằm mục tiêu và **tiêu diệt bọ ve Demodex** gây viêm bờ mi **Demodex (DB)**.^{1,2}

Chỉ định và cách sử dụng

XDEMVY (dung dịch nhỏ mắt lotilaner) 0.25% được chỉ định để điều trị viêm bờ mi *Demodex*.

Thông tin An toàn Quan trọng

Các tác dụng phụ thường gặp nhất: Tác dụng phụ thường gặp nhất trong các thử nghiệm lâm sàng là đau nhói và bỏng rát ở 10% bệnh nhân. Các tác dụng phụ khác xảy ra ở dưới 2% số bệnh nhân là viêm giác mạc chấp/hordeolum và viêm giác mạc có đốm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng trong tài liệu này và Thông tin kê toa đầy đủ.

VIỆC ĐIỀU TRỊ VIÊM BỜ MI DEMODEX CÓ THỂ LÀ MỘT THÁCH THỨC

Đỏ mí mắt, viêm và vảy (vảy mắt) do DB gây ra sẽ không hết được?^{3,4}

Hãy nhớ rằng, quý vị không đơn độc.


ĐANG CÓ KHOẢNG 25 TRIỆU NGƯỜI BỊ BỌ VE



Ước tính có khoảng 25 triệu bệnh nhân chăm sóc mắt ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi DB.^{3,5}

Viêm bờ mi *Demodex* là một bệnh ở mí mắt do sự xâm nhập của bọ ve *Demodex*, một loại bọ ve phổ biến được tìm thấy trên người.^{3,6} Khi không được điều trị, DB có thể khiến quý vị dễ bị các bệnh liên quan đến mắt khác.⁴

Sử dụng XDEMVMY® trong kế hoạch điều trị của quý vị có thể giúp quý vị loại bỏ hoàn toàn bọ ve!



Một giọt cho mỗi mắt, hai lần mỗi ngày (cách nhau ~ 12 giờ), trong 6 tuần.

Thông tin An toàn Quan trọng (tiếp theo)

Xử lý hộp đựng: Tránh để đầu của hộp đựng tiếp xúc với mắt, các cấu trúc xung quanh, các ngón tay, hoặc bất kỳ bề mặt nào khác để tránh làm dung dịch bị nhiễm bẩn. Tồn thương nghiêm trọng cho mắt và mất thị lực có thể là kết quả của việc sử dụng các dung dịch bị ô nhiễm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng trong tài liệu này và Thông tin kê toa đầy đủ.

xdemvy®
(lotilaner ophthalmic
solution) 0.25%

LOẠI BỎ BỌ VE VỚI XDEMVMY®


Là thuốc nhỏ mắt đầu tiên và duy nhất được FDA phê duyệt để điều trị viêm bờ mi *Demodex*, XDEMVMY có thể tiêu diệt ve, loại bỏ mẩn đỏ mí mắt và giảm vảy (mắt).^{1,2} Kết quả có thể khác nhau ở từng cá nhân.

ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÀ CÓ TÁC DỤNG TRỢ GIÚP

Trong hai nghiên cứu kết hợp, 50% bệnh nhân giảm vảy (vảy mắt) và 60% bệnh nhân đã sạch hoàn toàn bọ ve *Demodex*.^{7*} Bệnh nhân sử dụng XDEMVMY có thể thấy đỏ mí mắt biến mất chỉ trong 6 tuần.^{1,2}

LIỀU ĐƠN GIẢN

Một giọt mỗi mắt, hai lần một ngày, cách nhau ~12 giờ, chỉ trong 6 tuần.



ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO SỰ THOẢI MÁI

~90% số bệnh nhân trong cả hai thử nghiệm báo cáo thuốc nhỏ mắt XDEMVMY là trung tính đến rất thoải mái khi sử dụng.^{7†}

*Sử dụng XDEMVMY để điều trị viêm bờ mi *Demodex* được đánh giá trong 2 thử nghiệm then chốt ở 833 bệnh nhân (415 bệnh nhân nhận XDEMVMY).^{1,8,9}

Thử nghiệm 1: Khi dùng hai lần mỗi ngày ở mỗi mắt trong 6 tuần, so với những người không dùng XDEMVMY, XDEMVMY đã giảm số vảy xuống còn 2 hoặc ít hơn ở mí mắt trên ở 44% bệnh nhân (N = 209) vào Ngày 43; XDEMVMY đã loại trừ bọ ve (mật độ 0 bọ ve/mí mắt) ở 68% bệnh nhân (N = 212) vào Ngày 43.

Thử nghiệm 2: Khi dùng hai lần mỗi ngày ở mỗi mắt trong 6 tuần, so với những người không dùng XDEMVMY, XDEMVMY đã giảm số vảy xuống còn 2 hoặc ít hơn ở mí mắt trên ở 55% bệnh nhân (N = 193) vào Ngày 43; XDEMVMY đã loại trừ bọ ve (mật độ 0 bọ ve/mí mắt) ở 50% bệnh nhân (N = 203) vào Ngày 43.


†Tất cả các lần khám đều được tính trung bình.

Thông tin An toàn Quan trọng (tiếp theo)

Khi nào cần tìm lời khuyên của bác sĩ: Ngay lập tức xin lời khuyên của bác sĩ liên quan đến việc tiếp tục sử dụng XDEMVMY nếu bạn tái phát bệnh về mắt (ví dụ: chấn thương hoặc nhiễm trùng), phẫu thuật mắt hoặc có bất kỳ phản ứng mắt nào, đặc biệt là viêm kết mạc và kích ứng mí mắt.


Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng trong tài liệu này và Thông tin kê toa đầy đủ.

Vảy



TRƯỚC KHI DÙNG
XDEMVMY

SAU KHI DÙNG
XDEMVMY



Hình ảnh của bệnh nhân thực tế đã tham gia các thử nghiệm lâm sàng của Tarsus Pharmaceuticals. Kết quả có thể khác nhau. Bệnh nhân bị DB sử dụng XDEMVMY hai lần mỗi ngày, ở mỗi mắt, trong 6 tuần.

CÙNG VỚI XDEMVMY®



HÃY CÙNG CHUNG TAY
LOẠI BỎ BỌ VE

Cập nhật thông tin, nhận hỗ trợ và có thêm sức mạnh trong hành trình của bạn với DB.

Truy cập XDEMVMY.com để biết thêm thông tin hướng dẫn, câu chuyện thực tế của bệnh nhân và nhiều thông tin khác!

TIÊU DIỆT BỌ VE!

Thông tin An toàn Quan trọng (tiếp theo)

Sử dụng với Kính áp tròng: XDEMVMY có chứa kali sorbate, có thể làm mất màu kính áp tròng mềm. Phải tháo kính áp tròng trước khi nhỏ XDEMVMY và có thể đeo lại sau khi dùng 15 phút.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng trong tài liệu này và Thông tin kê toa đầy đủ.