

# XDEMZY® 让治疗更简单



重视每一滴药物！使用 XDEMZY 保持治疗效果。

每只眼睛一滴，每日两次（间隔约 12 小时），持续 6 周。设定闹钟，追踪您的剂量！

开始日期：\_\_\_\_\_

|       | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 第 1 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |
| 第 2 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |
| 第 3 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |
| 第 4 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |
| 第 5 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |
| 第 6 周 | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  | 上午  |
|       | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  | 下午  |

**重要提示：**请在整个 6 周的治疗过程中使用 XDEMZY。

- ➔ 如果您正在使用其他外用眼药，请确保每种眼药使用时间至少间隔 5 分钟
- ➔ 摘下隐形眼镜，在使用 XDEMZY 后等待 15 分钟再重新佩戴
- ➔ 咨询您的医生，继续保持您的眼睑卫生习惯

报告疑似不良反应，请拨打 1-888-421-4002 联系 Tarsus Pharmaceuticals，或拨打 1-800-FDA-1088 联系 FDA 或访问 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)。

请参阅本手册中的重要安全性信息和完整处方信息。

# XDEMZY® 访问和支持

xdemzy®  
(lotilaner ophthalmic solution) 0.25%



如果给您开了 XDEMZY 处方，您的医生会将您的处方发送至以下药房之一：

- AllianceRx Walgreens: 1-800-424-9002
- Carepoint Pharmacy: 1-855-237-9112
- BlinkRx: 1-833-919-4942
- CVS Specialty: 1-800-237-2767

- 1 您的医生发来处方后，预计药房会直接给您发短信或打电话，请准备好您的处方药保险信息  
**请务必回答，以免延误您的治疗**
    - 如果您在 48 小时内未接到电话或短信，请联系选定的药房
  - 2 药房将与您的医生一起完成所需的任何文书工作，并申请任何适用的优惠
  - 3 如果需要共付额，药房将联系您并要求您付款；在收到付款之前，不会发出处方
  - 4 药房将与您一起安排递送至您家或当地药房
  - 5 开始使用 XDEMZY
- 如需 XDEMZY 访问和支持，请致电 1-866-846-3092 联系 Tarsus Connect。

参考文献：1. XDEMZY. Prescribing information. Tarsus Pharmaceuticals Inc; 2023. 2. XDEMZY Pivotal Trial Data Presentation. Tarsus Pharmaceuticals Inc. 3. Trattler W, Karpecki P, Rapoport Y, et al. The prevalence of *Demodex* blepharitis in US eye care clinic patients as determined by collarettes: a pathognomonic sign. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:1153-1164. 4. Fromstein S, Harthan J, Patel J, et al. *Demodex* blepharitis: clinical perspectives. *Clin Optom (Auckl)*. 2018;10:57-63. 5. O'Dell L, Dierker DS, Devries DK, et al. Psychosocial impact of *Demodex* blepharitis. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:2979-2987. 6. Rhee MK, Yeu E, Barnett M, et al. *Demodex* blepharitis: a comprehensive review of the disease, current management, and emerging therapies. *Eye Contact Lens*. 2023;49(8):311-318. 7. Yeu E, Mun J, Vollmer P, et al. Treatment of *Demodex* blepharitis with lotilaner ophthalmic solution (0.25%): combined analysis of two pivotal randomized, vehicle-controlled, multicenter trials. Presented at: ARVO 2023; April 25-27, 2023; New Orleans, Louisiana. 8. Yeu E, Wirta DL, Karpecki P, Baba SN, Holdbrook M; Saturn 1 Study Group. Lotilaner ophthalmic solution, 0.25%, for the treatment of *Demodex* blepharitis: results of a prospective, randomized, vehicle-controlled, double-masked, pivotal trial (Saturn-1). *Cornea*. 2023;42(4):435-443. 9. Gaddie IB, Donnenfeld ED, Karpecki P, et al. Lotilaner ophthalmic solution 0.25% for *Demodex* blepharitis: randomized, vehicle-controlled, multicenter, phase 3 trial (Saturn-2). *Ophthalmology*. 2023;130(10):1015-1023.



©2024 Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Tarsus、Tarsus 徽标、XDEMZY、XDEMZY 徽标和本文中的某些其他商标是 Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 的商标。  
US-2400054 2/24

xdemzy®  
(lotilaner ophthalmic solution) 0.25%



图像是蠕形螨的特征表示。

# 您的眼脸上是否有 蠕虫困扰？



**XDEMZY** 是款也是唯一一款经美国食品药品监督管理局批准的靶向并消灭导致蠕形螨眼睑炎 (DB) 的蠕形螨虫的滴眼液，从而破除蠕虫的困扰。<sup>1,2</sup>

## 适应症和用途

XDEMZY (lotilaner 滴眼液) 0.25% 适用于治疗蠕形螨眼睑炎。

## 重要安全性信息

**最常见的副作用：**临床试验中最常见的副作用是 10% 的患者出现刺痛和烧灼感。不到 2% 的患者出现其他副作用，包括睑板腺囊肿/睑板腺炎和点状角膜炎。

请参阅本手册中的重要安全性信息和完整处方信息。

## 对付蠕形螨眼睑炎

可能有一定难度

DB 引起的眼睑红肿、炎症和结痂（眼睑溃疡）久治不愈？<sup>3, 4</sup>

请记住，您并不孤单。

目前有 2500 万人受螨虫困扰



据估计，美国约有 2500 万眼科患者受到 DB 的影响。<sup>3, 5</sup>

蠕形螨眼睑炎是一种由蠕形螨感染引起的眼睑疾病，蠕形螨是一种常见于人类的螨虫。<sup>3, 6</sup> 如果不及及时治疗，DB 可能会使您容易患上其他眼部相关疾病。<sup>4</sup>

在您的治疗计划中加入 XDEMZY 可以帮助您破除螨虫困扰！



每只眼睛一滴，每日两次（间隔约 12 小时），持续 6 周。

### 重要安全性信息（续）

**处理容器：**避免配药容器的尖端接触眼睛、眼部周围、手指或任何其他表面，以尽量减少溶液污染。使用受污染的溶液可能会对眼睛造成严重伤害，进而导致视力丧失。

请参阅本手册中的重要安全性信息和完整处方信息。

xdemzy<sup>®</sup>  
(lotilaner ophthalmic solution) 0.25%

## 用 XDEMZY 破除螨虫困扰


作为首款也是唯一一款经 FDA 批准的蠕形螨眼睑炎滴眼液，XDEMZY 可消灭螨虫、消除眼睑红肿并减少结痂（眼睑溃疡）。<sup>1, 2</sup> 效果因人而异。

### 经证实有帮助

在两项合并研究中，50% 的患者结痂（眼睑溃疡）减少，60% 的患者蠕形螨完全清除。<sup>7\*</sup> 使用 XDEMZY 的患者可在 6 周内看到眼睑红肿消失。<sup>1, 2</sup>

### 用药简单

每只眼睛一滴，每日两次，间隔约 12 小时，仅持续 6 周。



### 舒适设计

两项试验中约 90% 的患者报告 XDEMZY 滴眼液舒适度为中性至非常舒适。<sup>7†</sup>

\*在 833 名患者（415 名患者接受 XDEMZY）参加的 2 项关键性试验中对 XDEMZY 治疗蠕形螨眼睑炎进行了评估。<sup>1, 8, 9</sup>

**试验 1：**与未接受 XDEMZY 的患者相比，每只眼睛每日两次使用 6 周后，第 43 天时 XDEMZY 将 44% 的患者 (N=209) 上眼睑的眼睑溃疡减少至 2 或更少；第 43 天时 XDEMZY 根除 68% 的患者 (N=212) 的螨虫（螨虫密度为 0 / 睫毛）。

**试验 2：**与未接受 XDEMZY 的患者相比，每只眼睛每日两次使用 6 周后，第 43 天时 XDEMZY 将 55% 的患者 (N=193) 上眼睑的眼睑溃疡减少至 2 或更少；第 43 天时 XDEMZY 根除 50% 的患者 (N=203) 的螨虫（螨虫密度为 0 / 睫毛）。


†所有访视平均数。

### 重要安全性信息（续）

**何时寻求医生建议：**如果您出现眼部并发症（例如，创伤或感染）、眼部手术或出现任何眼部反应，尤其是结膜炎和眼睑反应，请立即就继续使用 XDEMZY 寻求医生的建议。


请参阅本手册中的重要安全性信息和完整处方信息。

结痂



XDEMZY 使用前

XDEMZY 使用后



图为参加 Tarsus Pharmaceuticals 临床试验的实际患者。效果可能因人而异。DB 患者每日每只眼睛使用 XDEMZY 两次，持续 6 周。

## 与 XDEMZY<sup>®</sup> 共同努力

### 让我们一起终结螨虫困扰



在感染 DB 的过程中，您可以随时了解情况、获得支持并增强能力。

请访问 [XDEMZY.com](http://XDEMZY.com) 了解更多教育信息、真实患者故事等！



## 困扰终结！

### 重要安全性信息（续）

**与隐形眼镜一同使用：**XDEMZY 含有山梨酸钾，可能会使软性隐形眼镜变色。滴注 XDEMZY 前应摘下隐形眼镜，并在给药后 15 分钟重新戴上隐形眼镜。

请参阅本手册中的重要安全性信息和完整处方信息。